

10-й клас

1. Розв'яжіть нерівність  $(x^2 + 1)^2 - 3(x^2 + 1) < 10$ .

**Відповідь:**  $x \in (-2, 2)$ .

**Розв'язання.** Уведемо позначення  $t = x^2 + 1$ :

$$\begin{aligned} t^2 - 3t < 10 &\Leftrightarrow (t+2)(t-5) < 0 \Leftrightarrow -2 < t < 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -2 < x^2 + 1 < 5 &\Leftrightarrow -3 < x^2 < 4 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow x \in (-2, 2). \end{aligned}$$

2. Попарно різні числа  $a$ ,  $b$  та  $c$  задовольняють умову  $a^2(b+c) = b^2(c+a)$ .  
Доведіть рівність  $c^2(a+b) = a^2(b+c)$ .

**Розв'язання.** Віднімемо від лівої частини заданого рівняння його праву частину:

$$a^2(b+c) - b^2(c+a) = a^2b - b^2a + a^2c - b^2c = ab(a-b) + c(a-b)(a+b) = (a-b)(ab+ac+bc).$$

Таким чином,  $(a-b)(ab+ac+bc) = 0$ , а оскільки за умовою числа попарно різні, тобто  $a-b \neq 0$ , то  $ab+ac+bc = 0$ . Скористаймося аналогічними викладками ще раз:

$$c^2(a+b) - a^2(b+c) = c^2a - a^2c + c^2b - a^2b = ac(c-a) + b(c-a)(c+a) = (c-a)(ac+bc+ab) = 0$$

Це й доводить рівність  $c^2(a+b) = a^2(b+c)$ .

3. На діагоналі  $BD$  паралелограма  $ABCD$  вибрані точки  $P$  та  $Q$  таким чином, що  $BP = PQ = QD$ . Прямі  $CP$  та  $CQ$  перетинають сторони  $AB$  та  $AD$  відповідно у точках  $M$  та  $N$ . Знайдіть відношення  $MN : BD$ .

**Відповідь:**  $MN : BD = 1 : 2$ .

**Розв'язання.** Проведемо діагональ  $AC$ , тоді точка перетину діагоналей  $O$  – ділить обидві діагоналі навпіл (рис. 8). Тоді для  $\triangle ABC$  відрізок  $BO$  – медіана, а точка  $P$  задовольняє умови  $BP : PO = 2 : 1$ , тобто  $P$  – точка перетину медіан  $\triangle ABC$ . Тому  $CM$  – також медіана  $\triangle ABC$ , а тому  $M$  – середина сторони  $AB$ , аналогічно  $N$  – середина сторони  $AD$ . Тому  $MN$  – середня лінія  $\triangle ABD$ , звідси і випливає, що  $MN : BD = 1 : 2$ .




Рис.

4. Якого найменшого значення може набувати сума цифр натурального числа  $n = (p^2 + 2)^2 - 9(p^2 - 7)$ , де  $p$  — просте число?

**Відповідь:** 4.

**Розв'язання.** Якщо  $p \neq 3$ , то  $p$  не ділиться на 3, тому  $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$ , звідки  $p^2 + 2 \equiv 3 \pmod{9}$  та  $n \equiv (p^2 + 2)^2 \equiv 0 \pmod{9}$ . Сума цифр натурального числа дає ту ж остачу від ділення на 9, що й саме число. При цьому, очевидно, сума не може дорівнювати нулю. Тому, коли  $p \neq 3$ , сума цифр числа  $n$  не менша за 9.

У випадку ж  $p = 3$  сума цифр числа  $n = (p^2 + 2)^2 - 9(p^2 - 7) = 11^2 - 18 = 103$  складає 4.

5. На нараду в Міністерство для обговорення питань олімпіад запросили 30 Заслужених вчителів України з математики, фізики, хімії та біології. Серед запрошених фізиків та біологів разом виявилось удвічі менше ніж математиків, а фізиків та хіміків разом удвічі більше ніж біологів. Скільки на зустріч запросили математиків, якщо вчителів з кожного предмету була різна кількість?

**Відповідь:** 18.

**Розв'язання.** Позначимо кількість вчителів математиків, фізиків, хіміків та біологів через  $m, f, h, b$  відповідно. Тоді маємо такі умови:

$$\begin{cases} m + f + h + b = 30, \\ f + b = \frac{1}{2}m, \\ f + h = 2b. \end{cases}$$

З другого та третього рівняння маємо:  $m = 2f + 2b$  та  $h = 2b - f$ . Якщо це підставити у перше рівняння, то матимемо, що  $2f + 5b = 30$ . Оскільки  $m, f, h, b$  – цілі невід'ємні числа, то зрозуміло, що  $b$  повинно бути парним числом від 0 до 6. Залишилося розглянути ці варіанти.

$$b = 0 \Rightarrow f = 15 \Rightarrow m = 30 \Rightarrow h = -15.$$

$$b = 2 \Rightarrow f = 10 \Rightarrow m = 24 \Rightarrow h = -6.$$

$$b = 4 \Rightarrow f = 5 \Rightarrow m = 18 \Rightarrow h = 3.$$

$$b = 6 \Rightarrow f = 0 \Rightarrow m = 12 \Rightarrow h = 12.$$

З умов задачі, очевидно, що шуканим є варіант, де  $m = 18$ .